

## ARRENDAJO (*Garrulus glandarius*)



### IDENTIFICACIÓN

Tamaño de 33-35 cm del pico a la cola. Plumaje mayoritario marrón rosado en dorso, cabeza y pecho, muy claro en garganta y vientre. Bigotera negra a ambos lados del pico. Finas estrías longitudinales negras y blancas en las plumas sobre la cabeza, que puede levantar a modo de pequeña cresta. Alas redondeadas con negro, azul claro y blanco. El color azul permite identificar perfectamente las plumas del ala de este pájaro. Larga cola negra y obispillo blanco. Pico oscuro, recio, aunque menos que el de otros córvidos. En vuelo es fácilmente identificable, ya que muestra el obispillo blanco (en contraste con la cola negra) y las manchas blancas y azules de las alas, y por la forma de volar, ondulante. Su llamada de alarma es inconfundible, ruidosa, áspera y desagradable, formada por gritos y chillidos de tipo “kchaaach”, “craaach”, “gaaach”, que emite cuando percibe un peligro, además de reproducir también una perfecta imitación del canto del ratonero común (*Buteo buteo*): “píaaa.... híaaaa.... pieuuuu....”.

### ENCUADRE TAXONÓMICO

Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Córvidos	<i>Garrulus</i>	<i>G. glandarius</i>






Arrendajo con la característica bigotera y estrias sobre la cabeza

## HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Una de las aves más asociadas al medio forestal en Europa. En Caudete aparece en las masas forestales (pinos y encinares) de la Sierra Oliva y al oeste de esta sierra, estando por tanto limitada su distribución al noroeste del término. Muy poco abundante, al menos en apariencia, por su poca detección y escasa superficie de distribución en el término. Asociado a los comederos y bebederos instalados por los cazadores.



## BIOLOGÍA

Ave sedentaria en el término. Puede ir en pequeños grupos, aunque en Caudete solo se han observado solitarios o por pares. Tímido y desconfiado, pero escandaloso cuando emite sus vocalizaciones, por lo que es más detectable por el canto que visualmente. Su graznido avisa de algún peligro y pone en alerta a otros animales. Sitúa el nido en árbol, donde pone 5-7 huevos. Omnívoro, se alimenta de frutos, semillas, insectos, pequeños reptiles, micromamíferos y huevos y crías de aves. Se aprovisiona en otoño principalmente de bellotas, ocultándolas en el suelo o en huecos o grietas de árboles y rocas, contribuyendo a la dispersión de las encinas al olvidar algunas bellotas, que acaban germinando.

## PROTECCIÓN LEGAL

Especie catalogada “de interés especial” en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).