

CARBONERO GARRAPINOS

(*Periparus ater*)



IDENTIFICACIÓN

Pájaro parecido al carbonero común, pero de menor tamaño (10-11,5 cm de longitud pico-cola), figura más delicada y cabeza proporcionalmente más grande. Se reconoce por la banda longitudinal blanca que recorre la nuca. Negro en cabeza y babero y blanco en mejillas. El blanco se prolonga hasta los lados del cuello sin que las prolongaciones laterales del babero lleguen a separarlo del resto del plumaje, mientras que en el carbonero común sí hay una línea negra que separa la mejilla blanca. Plumaje dorsal grisáceo, con dos franjas blancas en cada ala. Partes ventrales de tono cremoso. Cola más bien corta. Canto agudo y repetitivo de dos sílabas “mí-chi, mí-chi, mí-chi, mí-chi ...”. Anteriormente denominado científicamente como *Parus ater*.

ENCUADRE TAXONÓMICO


Clase	Orden	Familia	Género	Especie
Aves	Paseriformes	Páridos	<i>Periparus</i>	<i>P. ater</i>



Carbonero garrapinos buscando insectos. Se aprecia la banda de la nuca y las dos franjas del ala

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Ligado al medio forestal con coníferas (pinares). No es abundante en Caudete, siendo poco frecuente su observación, por lo que se desconoce su distribución exacta en el término municipal. Su presencia se delata muchas veces por su canto. Las observaciones realizadas lo sitúan en los pinares de Sierra Oliva-El Revolcador y Sierra Lácera-La Toconera. Su presencia en los bosquetes de pinares de la zona oeste de la Sierra Oliva, discontinuos y en manchas poco extensas, ya se citó anteriormente (García-Bañón *et al.* 1983, Cremades 2003). En un estudio realizado en el paraje de La Toconera y la Sierra Lácera, donde se diferenciaron 3 zonas (montaña, bosque-matorral y cultivos), esta especie nunca se localizó fuera de la zona de bosque y matorral, en concreto en el hábitat de ramblas, y con un porcentaje de detección del 25% en otoño-invierno (Cremades 2001).



BIOLOGÍA

Ave residente, aunque no se dispone de registros en verano (octubre a mayo). Cría a baja altura dentro de agujeros de árboles, rocas o taludes, incluso del suelo. Los nidos son agujeros de pequeña abertura tapizados de musgo, pelo y plumas. También en cajas-nido. Puesta numerosa (7-11 huevos), puede hacer dos al año. Muy activo por los árboles, se mueve a menudo por las ramas más externas y se cuelga cabeza abajo. En otoño se desplaza buscando alimento entre los pinos junto con otros páridos, reyezuelos listados (*Regulus ignicapillus*) y mitos (*Aegithalos caudatus*). Se alimenta de insectos y semillas de coníferas.

PROTECCIÓN LEGAL

Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011) y catalogada “de interés especial” en el Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/98).